

14AM120: Settimana 8

INTEGRAZIONE DI FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE

A titolo introduttivo, consideriamo due problemi, apparentemente scollegati:

PROBLEMA 1. (esistenza di una primitiva). Data f in un intervallo aperto I , esiste P (*primitiva*) derivabile in I e tale che $P' = f$ in I ?

PROBLEMA 2. Data $f \geq 0$ in $[a, b]$, come definire l'area del sottografico $\{(x, y) : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$?

La risposta al Problema 1 é: in generale NO. Una condizione necessaria é data dal

Teorema di Darboux

Se $P' = f$ in I intervallo aperto, allora f ha la proprietá del valore intermedio.

PROVA. Sia $\alpha = f(a), \beta = f(b), a, b \in I$. Possiamo supporre $a < b, \alpha < \beta$. Preso $\alpha < \gamma < \beta$, sia $g(x) = P(x) - \gamma x$. Siccome P é continua, g ha minimo in $[a, b]$. Tale minimo non puó essere preso in a , perché $g'(a) = \beta - \gamma < 0$, né in b , perché $g'(b) > 0$. Dunque il punto di minimo, diciamo c , é interno e quindi $0 = g'(c) = P'(c) - \gamma = f(c) - \gamma$, ovvero $f(c) = \gamma$.

Tale proprietá però non basta. Un esempio: $f(x) = \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$ se $x \neq 0, f(0) = 0$ e $P^\pm(x) = x \sin \frac{1}{x} + c^\pm$ sono le sue primitive in $(0, +\infty)$ e in $(-\infty, 0)$. Ma f , pur godendo ovviamente della proprietá del valore intermedio, non ammette primitiva P in $(-1, 1)$. Infatti dovrebbe essere $P = x \sin \frac{1}{x} + c^-$ in $(-1, 0)$ e $P = x \sin \frac{1}{x} + c^+$ in $(0, 1)$ e quindi, per continuitá, $c^+ = c^-$, ovvero $P = x \sin \frac{1}{x} + c$ per qualche c che però non é derivabile in zero per alcun c .

Circa il problema 2, vedremo un modo molto naturale di definire, nel caso ad esempio che f sia continua, l'area del suo sottografico. Indichiamo qui come la risoluzione del problema 2 porti a risolvere anche il problema 1. Chiamiamo $A(x), x \in (a, b)$ l'area del sottografico di f ristretta ad $[a, x]$. Se questa funzione ha le proprietá che ci aspettiamo dall'area (additività), avremo che il rapporto incrementale $\frac{A(x+h)-A(x)}{h}$ si scrive come $f(x)$ piú l'area del triangoloide di vertici $(x, f(x)), (x+h, f(x)), (x+h, f(x+h))$. Siccome f é limitata tale area deve andare (per la monotonia dell'area) a zero, e quindi $A(x)$ é una primitiva di f .

Richiamiamo alcune NOTAZIONI e semplici proprietà:

$x^+ := \frac{1}{2}(|x| + x) = x$ se $x \geq 0$, $x^+ = 0$ se $x \leq 0$, $x^- := x^+ - x$ e quindi
 $x^- := \frac{1}{2}(|x| - x) = 0$ se $x \geq 0$, $x^- = -x$ se $x \leq 0$, e quindi $x^+ + x^- = |x|$
 Si ha: $(-x)^+ = x^-$, $(-x)^- = x^+$, $(x+y)^+ \leq x^+ + y^+$, $(x+y)^- \leq x^- + y^-$

Se $A \subset \mathbf{R}$, $\inf_A f := \inf\{f(x) : x \in A\}$, $\sup_A f := \sup\{f(x) : x \in A\}$.

1. $\inf_{A \cup B} f \leq \inf_A f \leq \sup_A f \leq \sup_{A \cup B} f$
2. $\inf_A f + \inf_A g \leq \inf_A (f + g) \leq \sup_A (f + g) \leq \sup_A f + \sup_A g$
3. $\sup_A (-f) = -\inf_A f$, $\inf_A (-f) = -\sup_A f$ e quindi
4. $\inf_A f - \sup_A g \leq \inf_A (f - g) \leq \sup_A (f - g) \leq \sup_A f - \inf_A g$
5. $\chi_A \equiv 1$ in A , $\chi_A \equiv 0$ fuori di A é la funzione caratteristica di A .
6. Il supporto di f é la chiusura di $\{x : f(x) \neq 0\}$.

$f^+(x) := (f(x))^+$ e quindi $f^+ := f\chi_{\{x:f(x) \geq 0\}}$, quad $f^-(x) := (f(x))^-$ e quindi
 $f^- := -f\chi_{\{x:f(x) \leq 0\}}$ Chiaramente, $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$
 $(-f)^+ = f^-$, $(-f)^- = f^+$, $(f+g)^+ \leq f^+ + g^+$, $(f+g)^- \leq f^- + g^-$.

Se I é un intervallo di estremi $a \leq b$, $l(I) := b - a$ indicherá la sua lunghezza.
 Notare che se I_j sono n intervalli e $\cup_j I_j$ é un intervallo, allora é $l(\cup_j I_j) \leq \sum_j l(I_j)$
 e che, se I_j sono *intervalli 'quasi disgiunti'* (tali cioè che $I_j \cap I_l$ contiene al piú un punto $\forall j \neq l$) e $\cup_j I_j$ é un intervallo, allora $l(I) = \sum_j l(I_j)$. Piú in generale, se I_j , $j = 1, \dots, n$ sono intervalli 'quasi' disgiunti, scriveremo $l(\cup_{j=1}^n I_j) = \sum_{j=1}^n l(I_j)$.

Siano $I_j, j \in \mathbf{N}$ intervalli di estremi $a_j \leq b_j$, **limitati e quasi disgiunti**,
 cioè $(a_i, b_i) \cap (a_j, b_j) = \emptyset \quad \forall i \neq j$. Chiameremo I_j **partizione** di \mathbf{R} se

- (i) $\mathbf{R} = \cup_j I_j$, (ii) $\{a_j, b_j : j \in \mathbf{N}\}$ é privo di punti di accumulazione.

Notiamo che (i) assicura che $A = \cup_j (I_j \cap A) \quad \forall A \subset \mathbf{R}$, mentre (ii) assicura che $\{j : I_j \cap [-R, R] \neq \emptyset\}$ é finito $\forall R \geq 0$.

Se J_i é un'altra partizione di \mathbf{R} , diremo che J_i é **un raffinamento della I_j** se $\forall J_i, \exists I_j : J_i \subset I_j$. Se I_j, J_i sono partizioni, $I_{ij} := I_j \cap J_i$, é 'raffinamento' delle due partizioni. Notare che $I_j = \cup_i I_{ij}$, $J_i = \cup_j I_{ij}$ (unioni quasi disgiunte!)

INTEGRAZIONE DI FUNZIONI LIMITATE A SUPPORTO COMPATTO

Sia $b_0(\mathbf{R}) := \{f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} : f \text{ é limitata e a supporto compatto}\}$, ovvero
 $f \in b_0(\mathbf{R}) \Leftrightarrow \exists M > 0 : |f(x)| \leq M \quad \forall x \in \mathbf{R} \quad \text{e} \quad f(x) = 0 \text{ se } |x| \geq M.$

Somme inferiori/superiori di Riemann Integrale inferiore/superiore

Sia $f \in b_0(\mathbf{R})$. Sia I_j partizione di \mathbf{R} . Allora

$$s(f; I_j) := \sum_j (\inf_{I_j} f) l(I_j) \quad \text{é somma inferiore}$$

$$S(f; I_j) := \sum_j (\sup_{I_j} f) l(I_j) \quad \text{é somma superiore}$$

$\underline{I}(f) := \sup\{s(f; I_j) : I_j \text{ partizione di } [a, b]\}$ é l' integrale inferiore di f

$\bar{I}(f) := \inf\{S(f; I_j) : I_j \text{ partizione di } [a, b]\}$ é l' integrale superiore di f

LEMMA 1 Se I_j, J_i sono due partizioni e $I_{ij} := I_j \cap J_i$, allora

$$s(f; I_j) \leq s(f; I_{ij}) \leq S(f; I_{ij}) \leq S(f; J_i)$$

e quindi $s(f; I_j) \leq S(f; J_i)$ e quindi $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$. Infatti

$$s(f; I_{ij}) = \sum_{ij} \inf_{I_{ij}} f l(I_{ij}) \geq \sum_j \sum_i \inf_{I_j} f l(I_{ij}) = \sum_j \inf_{I_j} f l(I_j) = s(f; I_j)$$

$$S(f; I_{ij}) = \sum_{ij} \sup_{I_{ij}} f l(I_{ij}) \leq \sum_j \sum_i \sup_{I_j} f l(I_{ij}) = \sum_j \sup_{I_j} f l(I_j) = S(f; I_j)$$

NOTA. Piú in generale, *raffinando la partizione le somme inferiori crescono, le somme superiori decrescono.*

DEFINIZIONE $f \in b_0(\mathbf{R})$ é integrabile su \mathbf{R} se $\bar{I}(f) = \underline{I}(f)$. Si scrive

$$\int_{\mathbf{R}} f = \int_{\mathbf{R}} f(x) dx := \bar{I}(f) = \underline{I}(f)$$

ESEMPLI.

1. Sia $-L \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in \mathbf{R}, \quad f(x) = 0 \quad \text{se} \quad |x| \geq R$. Allora $-2LR \leq \underline{I}(f) \leq \bar{I}(f) \leq 2MR$. Infatti, se I_j é partizione con $I_1 := [-R, R]$, allora $-2LR \leq s(f, I_j) \leq S(f; I_j) = 2R \sup_{I_1} f \leq 2MR$.

2. Sia J un intervallo limitato, $f = \chi_{\mathbf{Q} \cap J}$. É $\bar{I}(f) = l(J), \quad \underline{I}(f) = 0$. Infatti, I_j partizione, $I_j \cap J \neq \emptyset \Rightarrow \sup_{I_j} f = 1, \quad \inf_{I_j} f = 0$.

3. Se $I_j, j \in \mathbf{N}$ sono intervalli limitati 'quasi disgiunti', $f = \chi_{\cup_{j=1}^n I_j}$ é integrabile per ogni n e $\int \chi_{\cup_{j=1}^n I_j} = \sum_{j=1}^n l(I_j)$. Infatti, f é nulla fuori di $\cup_{j=1}^n I_j$, e quindi, aggiungendo altri $I_j, j \geq n+1$ in modo da ottenere una partizione di \mathbf{R} , troviamo che $s(f, I_j) = \sum_{j=1}^n l(I_j) = S(f, I_j)$.

Domanda: $\chi_{\cup_{j=1}^{\infty} I_j}$ é integrabile? *Risposta:* in generale no! ... (vedi Appendice)

LEMMA 2 $\bar{I}(f) = \underline{I}(f)$ se e solo se $\forall \epsilon > 0 \quad \exists I_j^\epsilon$ partizione :

$$\sum_j (\sup_{I_j} f - \inf_{I_j} f) l(I_j) = S(f; I_j^\epsilon) - s(f; I_j^\epsilon) \leq \epsilon \quad (*)$$

Infatti $0 \leq \bar{I}(f) - \underline{I}(f) \leq S(f; I_j) - s(f; I_j)$ per ogni partizione I_j . Quindi (*) implica $\bar{I}(f) = \underline{I}(f)$. Viceversa, dalla definizione di $\bar{I}(f), \underline{I}(f)$ come estremo inferiore (rispettivamente, superiore), segue che, fissato ϵ , esistono partizioni $I_j^\epsilon, J_i^\epsilon$ tali che

$$S(f; I_j^\epsilon) \leq \bar{I}(f) + \epsilon, \quad s(f; J_i^\epsilon) \geq \underline{I}(f) - \epsilon$$

e quindi $S(f; I_j^\epsilon \cap J_i^\epsilon) - s(f; J_i^\epsilon \cap I_j^\epsilon) \leq \bar{I}(f) + \epsilon - \underline{I}(f) + \epsilon = 2\epsilon$ se $\bar{I}(f) = \underline{I}(f)$.

Teorema di Riemann (integrabilitá delle funzioni continue)

Sia $f \in C_0(\mathbf{R})$ (cioé $f \in b_0(\mathbf{R}) \cap C(\mathbf{R})$) . Allora f é integrabile.

Prova. Sia $f(x) = 0$ se $|x| \geq R$. Per Heine-Cantor,

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta_\epsilon > 0 : \quad |x - y| \leq \delta_\epsilon \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \frac{\epsilon}{2R}$$

Sia n tale che $\frac{R}{n} \leq \delta_\epsilon$. Siano $I_j = [-R + \frac{(j-1)R}{n}, -R + \frac{Rj}{n}]$ per $j = 1, \dots, 2n$. Gli I_j sono quasi disgiunti, $l(I_j) = \frac{R}{n}, \quad \forall j = 1, \dots, 2n$ e la loro unione é $[-R, R]$. Siano $I_j, j \geq 2n+1$ tali che $I_j, j \in \mathbf{N}$ sia partizione di \mathbf{R} . Siano $x_j, y_j \in I_j$ tali che

$f(x_j) = \sup_{I_j} f, \quad f(y_j) = \inf_{I_j} f.$ Allora

$$S(f, I_j) - s(f, I_j) = \sum_{j=1}^{2n} [\sup_{I_j} f - \inf_{I_j} f] l(I_j) = \sum_{j=1}^{2n} [f(x_j) - f(y_j)] \frac{R}{n} \leq 2n \frac{\epsilon}{2R} \frac{R}{n} = \epsilon$$

NOTA . Se f ha un punto di discontinuitá, diciamo in x_0 , modificando la partizione I_j in $I_j \cap J_i$, ove $J_1 = [-\infty, x_0 - \delta)$, $J_2 = [x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $J_3 = [x_0 + \delta, +\infty)$ e $2\delta \sup_{J_2} |f| \leq \epsilon$, vediamo che $S(f; I_j) - s(f; I_j) \leq 2\epsilon$, e quindi f é integrabile.

Se f ha p discontinuitá x_i e $2\delta \sup_{|x-x_i| \leq \delta} |f| \leq \frac{\epsilon}{p}$, si trova ancora $S(f; I_j) - s(f; I_j) \leq 2\epsilon$ e quindi f é integrabile.

Teorema di Lebesgue-Vitali Sia $D_f := \{x \in \mathbf{R} : f \text{ é discontinua in } x\}$

Allora $f \in b_0(\mathbf{R})$ é integrabile se e solo se D_f é di misura nulla.

Esempio. Sia $A \subset \mathbf{R}$ limitato; χ_A é integrabile sse ∂A ha misura nulla, perché

$$D_{\chi_A} = \partial A := \{x \in \mathbf{R} : (x-r, x+r) \cap A \neq \emptyset \neq (x-r, x+r) \cap A^c \quad \forall r > 0\}$$

LINEARITÁ DELL'INTEGRALE. Siano $f, g \in b_0(\mathbf{R})$ integrabili. Allora

$$\alpha, \beta \in \mathbf{R} \Rightarrow \alpha f + \beta g \text{ é integrabile e } I(\alpha f + \beta g) = \alpha I(f) + \beta I(g)$$

$$\alpha \geq 0 \Rightarrow \underline{I}(\alpha f) = \alpha \underline{I}(f) \quad \bar{I}(\alpha f) = \alpha \bar{I}(f) \quad \text{perché}$$

$$\inf_I(\alpha f) = \alpha \inf_I f, \quad \sup_I(\alpha f) = \alpha \sup_I f \quad \text{mentre}$$

$$\sup_A(-f) = -\inf_A f, \quad \inf_A(-f) = -\sup_A f \Rightarrow \bar{I}(-f) = -\underline{I}(f), \quad \underline{I}(-f) = \bar{I}(f).$$

Integrabilitá (ed integrale) della somma: seguono dal fatto che

$$(*) \quad \underline{I}(f) + \underline{I}(g) \leq \underline{I}(f+g) \leq \bar{I}(f+g) \leq \bar{I}(f) + \bar{I}(g) \quad \text{Prova di } (*):$$

$$(f+g)(x) \leq \sup_{x \in I_j} f(x) + \sup_{x \in I_j} g(x) \quad \forall x \in I_j \Rightarrow \sup_{I_j} (f+g) \leq \sup_{I_j} f + \sup_{I_j} g \Rightarrow$$

$$\bar{I}(f+g) \leq S(f+g, I_j) \leq S(f, I_j) + S(g, I_j)$$

D'altra parte, esistono partizioni $I_j^\epsilon, J_i^\epsilon$ tali che

$$S(f; I_j^\epsilon) + S(g; J_i^\epsilon) \leq \bar{I}(f) + \epsilon + \bar{I}(g) + \epsilon$$

Se $I_{ij} := I_j^\epsilon \cap J_i^\epsilon$, allora $\bar{I}(f+g) \leq S(f; I_{ij}) + S(g; I_{ij}) \leq \bar{I}(f) + \bar{I}(g) + 2\epsilon \quad \forall \epsilon > 0$. Analogamente si prova la disuguaglianza a sinistra in (*).

NOTA . Notiamo che é in generale falso che $\underline{I}(f + g) = \underline{I}(f) + \underline{I}(g)$. Prendere ad esempio $f = \chi_{[0,1] \cap \mathbf{Q}}$, $g = \chi_{[0,1] \setminus \mathbf{Q}}$: $\underline{I}(f + g) = 1$, $\underline{I}(f) = \underline{I}(g) = 0$.

Proposizione. Siano f, g integrabili. Allora

- (i) $|f|, f^+, f^-$ sono integrabili e quindi $\int_{\mathbf{R}} f = \int_{\mathbf{R}} f^+ - \int_{\mathbf{R}} f^-$
- (ii) fg é integrabile.

Prova. (i) Basta mostrare che $\sup_I |f| - \inf_I |f| \leq \sup_I f - \inf_I f$. Se $f \geq 0$ é ovvio. Se $f \leq 0$, é $\sup_I |f| - \inf_I |f| = \sup_I (-f) - \inf_I (-f) = -\inf_I f + \sup_I f$. Sia dunque $\inf_I f < 0 < \sup_I f$. Da $\sup_I |f| = \max\{\sup_I f, -\inf_I f\}$, segue

$$\sup_I f \geq -\inf_I f \Rightarrow \sup_I |f| - \inf_I |f| = \sup_I f - \inf_I |f| \leq \sup_I f \leq \sup_I f - \inf_I f$$

$$\sup_I f \leq -\inf_I f \Rightarrow \sup_I |f| - \inf_I |f| \leq -\inf_I f \leq -\inf_I f + \sup_I f$$

(ii) Proviamolo dapprima nel caso $g = f$. Intanto, da $|f| \geq 0$ in I segue

$$\sup_I f^2 = (\sup_I |f|)^2, \quad \inf_I f^2 = (\inf_I |f|)^2 \quad \text{Infatti,}$$

$$0 \leq |f(x)| \leq \sup_I |f| \quad \forall x \in I \Rightarrow f^2(x) \leq (\sup_I |f|)^2 \Rightarrow \sup_I f^2 \leq (\sup_I |f|)^2$$

Poi, fissato ϵ piccolo, esiste $x_\epsilon \in I$ tale che $|f(x_\epsilon)| \geq \sup_I |f| - \epsilon > 0$ e quindi $\sup_I |f|^2 \geq |f(x_\epsilon)|^2 \geq (\sup_I |f| - \epsilon)^2 = (\sup_I |f|)^2 + O(\epsilon)$ e quindi, mandando ϵ a zero, $\sup_I |f|^2 \geq (\sup_I |f|)^2$. Analogamente si vede che $\inf_I f^2 = (\inf_I |f|)^2$.

Ma allora, $\sup_I f^2 - \inf_I f^2 = (\sup_I |f|)^2 - (\inf_I |f|)^2 =$

$$[\sup_I |f| - \inf_I |f|] \times [\sup_I |f| + \inf_I |f|] \leq 2 \sup_I |f| \times [\sup_I |f| - \inf_I |f|] \Rightarrow$$

$$S(f^2, I_j) - s(f^2, I_j) \leq 2 \sup_I |f| [S(|f|, I_j) - s(|f|, I_j)]$$

e quindi f^2 é integrabile perché lo é $|f|$.

Infine, l'integrabilitá di fg segue da $fg = \frac{(f+g)^2 - (f-g)^2}{4}$.

NOTA . L'integrabilitá di $|f|$ non comporta (sfortunatamente!) l'integrabilitá di f (ad esempio, $f = \chi_{[0,1] \cap (\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q})} - \chi_{[0,1] \cap \mathbf{Q}}$. Qui f^+ ed f^- non sono integrabili!).

MONOTONIA DELL'INTEGRALE. $f, g \in b_0(\mathbf{R})$ integrabili \Rightarrow

$$f \leq g \Rightarrow I(f) \leq I(g).$$

Prova. $0 \leq g - f \Rightarrow 0 \leq I(g - f) = I(g) - I(f)$.

UNA DISEGUAGLIANZA INTEGRALE.

$$\left| \int_{\mathbf{R}} f \right| \leq \int_{\mathbf{R}} |f| \quad \forall f \in b_0(\mathbf{R})$$

Prova. $|\int_{\mathbf{R}} f| = |\int_{\mathbf{R}} f^+ - \int_{\mathbf{R}} f^-| \leq \int_{\mathbf{R}} f^+ + \int_{\mathbf{R}} f^- = \int_{\mathbf{R}} |f|$.

APPENDICE: L'INSIEME DI CANTOR

Diamo qui un esempio di un insieme aperto O , unione numerabile di intervalli disgiunti, tale che χ_O non é integrabile.

Sia $1 > r_1 \dots \geq r_n \dots, r_n \rightarrow r \geq 0$, $l_n = \frac{r_n}{2^n}$, $J_{1,1} := [0, 1]$.

Sia $I_{1,1}$ l'intervallo aperto, centrato nel punto medio di $J_{1,1}$ e di lunghezza $l(I_{1,1}) = 1 - 2l_1$ (intervallo centrale).

Siano $J_{2,1}, J_{2,2}$ gli intervalli ottenuti rimuovendo $I_{1,1}$ da $J_{1,1}$. Siano $I_{2,1}, I_{2,2}$ i corrispondenti intervalli centrali di lunghezza $l_1 - 2l_2$.

Iterando, si costruiscono

$I_{n,j}, j = 1, \dots, 2^{n-1}$ intervalli aperti di lunghezza $l_{n-1} - 2l_n$.

Risulta

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{2^{n-1}} (l_{n-1} - 2l_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (r_{n-1} - r_n) = 1 - r$$

Notiamo anche che l'aperto

$$O := \cup_{n=1}^{\infty} \cup_{j=1}^{2^{n-1}} I_{n,j}$$

é denso in $[0, 1]$. Da ciò segue che le somme superiori di $\chi_{\cup_{n=1}^{\infty} \cup_{j=1}^{2^{n-1}} I_{n,j}}$ valgono almeno 1, mentre ogni somma inferiore vale al piú $1 - r$. Dunque

$\chi_{\cup_{n=1}^{\infty} \cup_{j=1}^{2^{n-1}} I_{n,j}}$ non é integrabile

L'insieme $[0, 1] \setminus O$ si chiama **insieme di Cantor** generalizzato (Cantor se $r_n = (\frac{2}{3})^n$).