I Esonero di Metodi Matematici per l'Ottica del 10 - 5 - 2017

E. Scoppola

TESTO 1

Esercizio 1

Determinare e disegnare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x, y) = \frac{\log(y - 2x^2)}{\sqrt{x^2 + y^2 - 4}}$$

Abbiamo le condizioni:

$$y > 2x^2, \quad x^2 + y^2 > 4$$

e dunque la regione

Esercizio 2

Determinare il gradiente e la derivata direzionale della seguente funzione nella direzione indicata e nel punto indicato

$$g(x, y) = e^{x(x+y)}, \quad \mathbf{v} = (0, -1), \quad P = (2, 1)$$

Abbiamo

$$\nabla f(x, y) = (e^{x(x+y)}(2x + y), e^{x(x+y)}x)$$

che calcoliamo in P :

$$\nabla f(2, 1) = (5e^6, 2e^6)$$

e dunque

$$f_{\hat{\mathbf{v}}}(2, 1) = -2e^6$$

Esercizio 3

Determinare massimi e minimi della funzione

$$f(x, y) = x^3 - 3x + xy^2$$

Risolviendo il sistema di equazioni:

$$f_x = 3x^2 - 3 + y^2 = 0$$

$$f_y = 2xy = 0$$

otteniamo i punti critici:

$$P_1 = (1, 0), P_2 = (-1, 0), P_3 = (0, -\sqrt{3}), P_4 = (0, \sqrt{3})$$

Per determinare i massimi e i minimi studiamo le derivate seconde:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}$$

che calcolato in P_1 ha determinante positivo e primo elemento positivo dunque P_1 è minimo; calcolato in P_2 ha determinante positivo e primo elemento negativo dunque P_2 è massimo; calcolato in P_3 e P_4 ha determinante negativo dunque questi punti sono selle.

Esercizio 4

Studiare il carattere delle serie numeriche:

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}}, \quad S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^{n-1}}{n!}, \quad a \geq 0$$

S_1 è una serie a termini non negativi che per il criterio del confronto converge, infatti

$$\frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}} < \frac{1}{n^{3/2}}$$

armonica generalizzata che converge. La serie S_2 ha termini positivi e per il criterio del rapporto converge, infatti

$$\frac{a^n}{(n+1)!} \frac{n!}{a^{n-1}} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$$

Esercizio 5

Calcolare

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3-2^n}{4^n}$$

Abbiamo in entrambi i casi serie geometriche:

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{e^2}\right)^n = \frac{1}{1-1/e^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3-2^n}{4^n} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 4 - 2 = 2$$

Esercizio 6

Sviluppare in serie di Taylor attorno al punto $x = 0$ la funzione

$$f(x) = \log \sqrt{1+x} = \frac{1}{2} \log(1+x)$$

Ricordando lo sviluppo di $\log(1+x)$ ottenuto integrando la geometrica di ragione $-x$ otteniamo

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

Esercizio 7

Sviluppare in serie di Fourier in $[-\pi, \pi]$ la funzione periodica

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{per } x \in (-\pi, 0) \\ 2x & \text{per } x \in [0, \pi) \end{cases}$$

Otteniamo

$$f(x) = \frac{3}{4}\pi - \frac{6}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin nx}{n}$$

infatti:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-x) dx + \int_0^{\pi} 2x dx \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi^2}{2} + 2 \frac{\pi^2}{2} \right) = \frac{3}{4}\pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-x) \cos nx dx + \int_0^{\pi} 2x \cos nx dx \right)$$

Calcoliamo, integrando per parti, l'integrale

$$\int_a^b x \cos nx dx = x \frac{\sin nx}{n} \Big|_a^b - \int_a^b \frac{\sin nx}{n} dx = x \frac{\sin nx}{n} \Big|_a^b + \frac{\cos nx}{n^2} \Big|_a^b \quad (1)$$

Considerando che $\sin n\pi = 0$ per ogni n e che $\cos n\pi = \cos(-n\pi) = (-1)^n$ otteniamo che $a_n = 0$ per n pari mentre per n dispari abbiamo

$$a_n = \frac{1}{n^2\pi} (-2 - 4) = -\frac{6}{n^2\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-x) \sin nx dx + \int_0^{\pi} 2x \sin nx dx \right)$$

Calcoliamo, integrando per parti, l'integrale

$$\int_a^b x \sin nx dx = -x \frac{\cos nx}{n} \Big|_a^b + \int_a^b \frac{\cos nx}{n} dx = -x \frac{\cos nx}{n} \Big|_a^b + \frac{\sin nx}{n^2} \Big|_a^b \quad (2)$$

e dunque

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(x \frac{\cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 - 2x \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{(-1)^n}{n}$$

TESTO 2

Esercizio 1

Determinare e disegnare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x, y) = \frac{\log(y - e^x)}{\sqrt{4 - (x^2 + y^2)}}$$

Abbiamo le condizioni:

$$y > e^x, \quad x^2 + y^2 < 4$$

e dunque la regione

Esercizio 2

Determinare il gradiente e la derivata direzionale della seguente funzione nella direzione indicata e nel punto indicato

$$g(x, y) = \log(1 + x^2 + y^2), \quad \mathbf{v} = (0, 1), \quad P = (1, 1)$$

Abbiamo

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \frac{2y}{1 + x^2 + y^2} \right)$$

che calcoliamo in P :

$$\nabla f(1, 1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

e dunque

$$f_{\mathbf{v}}(1, 1) = \frac{2}{3}$$

Esercizio 3

Determinare massimi e minimi della funzione

$$f(x, y) = (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

Risolvendo il sistema di equazioni:

$$f_x = 2x(y^2 - 1) = 0$$

$$f_y = 2y(x^2 - 1) = 0$$

otteniamo i punti critici:

$$P_1 = (0, 0), P_2 = (-1, -1), P_3 = (-1, 1), P_4 = (1, -1), P_5 = (1, 1)$$

Per determinare i massimi e i minimi studiamo le derivate seconde:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 2(y^2 - 1) & 4xy \\ 4xy & 2(x^2 - 1) \end{pmatrix}$$

che calcolato in P_1 ha determinante positivo e primo elemento negativo dunque P_1 è massimo; calcolato in P_2, P_3, P_4, P_5 ha determinante negativo dunque questi punti sono selle.

Esercizio 4

Studiare il carattere delle serie numeriche:

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}, \quad S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^{n+1}}{(n-1)!}, \quad a \geq 0$$

S_1 è una serie a termini non negativi che per il criterio del confronto diverge, infatti

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} > \frac{1}{\sqrt{2n}}$$

armonica generalizzata che diverge. La serie S_2 ha termini positivi e per il criterio del rapporto converge, infatti

$$\frac{a^{n+2}}{n!} \frac{(n-1)!}{a^{n+1}} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$$

Esercizio 5

Calcolare

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+2^n}{5^n}$$

Abbiamo in entrambi i casi serie geometriche: la prima è la geometrica di ragione a che non ha limite per $a \leq -1$, converge a $\frac{1}{1-a}$ per $a \in (-1, 1)$ e diverge per $a > 1$. Per la seconda scriviamo

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+2^n}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = \frac{5}{4} + \frac{5}{3} = \frac{35}{12}.$$

Esercizio 6

Sviluppare in serie di Taylor attorno al punto $x = 0$ la funzione

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Lo sviluppo in serie di potenze lo otteniamo direttamente derivando la geometrica di ragione x . Otteniamo

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

Esercizio 7

Sviluppare in serie di Fourier in $[-\pi, \pi]$ la funzione periodica

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{per } x \in (-\pi, 0) \\ -3x & \text{per } x \in [0, \pi) \end{cases}$$

Otteniamo

$$f(x) = -\pi + \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin nx}{n}$$

Infatti

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^0 x dx + \int_0^{\pi} (-3)x dx \right) = \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{\pi^2}{2} - 3\frac{\pi^2}{2} \right) = -\pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 x \cos nx dx + \int_0^{\pi} (-3x) \cos nx dx \right)$$

Considerando l'equazione (1) e ricordando che $\sin n\pi = 0$ per ogni n e che $\cos n\pi = \cos(-n\pi) = (-1)^n$ otteniamo che $a_n = 0$ per n pari mentre per n dispari abbiamo

$$a_n = \frac{1}{n^2\pi} (2 + 6) = \frac{8}{n^2\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 x \sin nx dx - 3 \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right)$$

Considerando l'equazione (2) abbiamo

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(-x \frac{\cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 + 3x \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{(-1)^n}{n} + 3 \frac{(-1)^n}{n} = 2 \frac{(-1)^n}{n}$$