

## Corso di Topologia di base della Professoressa Caporaso

Tutorato III del 10 – 03 – 2008

Tutore: Gabriele Nocco

<http://www.matematica3.com>

### Esercizio 1

Se  $X$  è un sottospazio di  $\mathbb{R}^m$ , con  $m < n$ , allora  $X \times \mathbb{R}^{n-m}$  si dice il cilindro di base  $X$ .

In quest'ottica considerare lo spazio:

$$Y := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}.$$

### Esercizio 2

Il prodotto di  $n$  copie di  $S^1$  si chiama toro  $n$ -dimensionale, o  $n$ -toro, e si denota con  $T^n$ . Ovviamente poichè  $S^1 \subset \mathbb{R}^2$  si ha che  $T^n \subset \mathbb{R}^{2n}$ .

Il 2-toro é omeomorfa al sottospazio di  $\mathbb{R}^4$

$$T^2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1 = x_3^2 + x_4^2\}$$

Verificare che le applicazioni

$$h(x_1, x_2, x_3, x_4) = ((x_1 + 2)x_3, (x_1 + 2)x_4, x_2)$$

e

$$g(y_1, y_2, y_3) = (\sqrt{y_1^2 + y_2^2} - 2, y_3, \frac{y_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, \frac{y_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}})$$

sono omeomorfismi tra  $T^2$  e  $T = \{(x_1, x_2, x_3) \mid (\sqrt{x_1^2 + x_2^2} - 2)^2 + x_3^2 = 1\}$ .

### Esercizio 3

Dimostrare che su  $X_1$  e  $X_2$  sono due spazi topologici allora l'applicazione

$$\sigma : X_1 \times X_2 \rightarrow X_2 \times X_1$$

definita da  $\sigma(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$  é un omeomorfismo.

### Esercizio 4

Sia  $X$  uno spazio metrizzabile. Dimostrare che la distanza  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  é una applicazione continua rispetto la topologia prodotto.

**Esercizio 5**

Dimostrare che essere  $T_1$  (rispettivamente  $T_2$ , regolare, normale) é una proprietà topologica per uno spazio  $X$ .

**Esercizio 6**

Dimostrare che un insieme infinito con la topologia cofinita non é metrizzabile.