

**Università degli Studi Roma Tre**  
**Corso di Laurea in Matematica, a.a. 2016/2017**  
**AL210 - Esercizi 1: Operazioni**

1. Si consideri in  $\mathbb{Z}$  l'operazione definita da

$$a \star b := a^2 + b.$$

- Stabilire se l'operazione  $\star$  è associativa o/e commutativa;
- Stabilire se esiste in  $\mathbb{Z}$  un elemento neutro a destra o/e a sinistra rispetto all'operazione  $\star$ .

2. Si consideri in  $\mathbb{Z}_8$  l'operazione definita da

$$a * b := ab - 1.$$

- Stabilire se  $(\mathbb{Z}_8, *)$  è un gruppo.

3. Si considerino le operazioni binarie su  $\mathbb{Z}$  denotate rispettivamente  $\cdot, \diamond, \Delta$  e definite, per ogni  $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , nel modo seguente:

$$x \cdot y := x + y + 1; \quad x \diamond y := |x| + y; \quad x \Delta y := xy + 1.$$

- Per ognuna di queste operazioni stabilire se sono verificate le proprietà: associativa, commutativa, esistenza di elemento neutro.
- Descrivere gli eventuali elementi simmetrizzabili rispetto a ciascuna delle operazioni.

4. Sia  $X := \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ . Date le seguenti operazioni binarie su  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ :

$$(a, b) + (\alpha, \beta) := (a + \alpha, b + \beta); \quad (a, b) \bullet (\alpha, \beta) := (a\alpha, ab + a\beta),$$

dimostrare che:

- Le rispettive restrizioni a  $X$  sono operazioni binarie su  $X$ ;
- $+$  e  $\bullet$  sono associative e commutative su  $X$ ;
- Esiste in  $X$  l'elemento neutro per entrambe le operazioni;
- Vale la proprietà distributiva di  $\bullet$  rispetto a  $+$ ;
- Ogni elemento di  $X$  è simmetrizzabile rispetto a  $+$  ed esistono elementi di  $X$  che non sono simmetrizzabili rispetto a  $\bullet$ .

5. Sia  $X$  un insieme e  $\mathcal{P}(X)$  il suo insieme delle parti.
- Dimostrare che l'unione, l'intersezione e la differenza simmetrica  $\Delta$  sono operazioni binarie su  $\mathcal{P}(X)$ .
  - Stabilire se l'unione e l'intersezione hanno l'elemento neutro e determinare, se esistono, gli elementi simmetrizzabili.
  - Sia  $A \subseteq X$  un sottoinsieme non vuoto e  $P_A := \{B : A \subseteq B \subseteq X\}$ . Dimostrare che l'unione è una operazione binaria su  $P_A$ . Stabilire se esiste l'elemento neutro.
  - Dimostrare che esiste l'elemento neutro per  $\Delta$  e che ogni elemento di  $\mathcal{P}(X)$  è simmetrizzabile rispetto a  $\Delta$ .
6. Sia  $X$  un insieme totalmente ordinato.
- Dimostrare che l'applicazione che associa  $\max(a, b)$  (resp.  $\min(a, b)$ ) alla coppia di elementi  $(a, b) \in X \times X$  è una operazione binaria su  $X$ .
  - Stabilire se l'operazione  $\max(a, b)$  (resp.  $\min(a, b)$ ) è associativa e se è commutativa.
  - Determinare condizioni necessarie e sufficienti sull'insieme  $X$  affinché esista l'elemento neutro per l'operazione  $\max$  (resp.  $\min$ ). Assumendo soddisfatte tali condizioni, determinare, se esistono, gli elementi simmetrizzabili.
  - Stabilire se valgono le proprietà distributive di  $\min$  rispetto a  $\max$  e viceversa su  $X$ .
  - Sia  $X := \{5, 7, 24, 87\}$ . Scrivere la tabella moltiplicativa di  $X$  con l'operazione  $\max$  e con l'operazione  $\min$ .
7. Stabilire se l'insieme  $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$  è un gruppo rispetto al prodotto così definito:  $(a, b)(c, d) = (ac, bc + d)$ .
8. Sia  $V$  l'insieme dei vettori nello spazio ordinario. Se  $w \in V$ , sia  $\tau_w : V \rightarrow V, v \rightarrow v + w$ , la *traslazione* definita da  $w$ .  
Mostrare che l'insieme delle traslazioni  $T = \{\tau_w; w \in V\}$  è un gruppo rispetto alla composizione di funzioni.
9. Siano
- $$U := \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}; \quad V := \{z \in \mathbb{C}; z^n = 1 \text{ per un opportuno } n \geq 1\}.$$

Mostrare che  $U$  è un gruppo moltiplicativo (sottogruppo di  $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ) e che  $V$  è un sottogruppo di  $U$ .

10. Verificare che l'anello  $2\mathbb{Z}_{12}$  non è unitario, ma il suo sottoanello  $4\mathbb{Z}_{12}$  lo è.
11. Sia  $A$  un anello. Verificare che l'insieme  $\mathcal{M}_n(A)$  delle matrici quadrate di ordine  $n$  a coefficienti in  $A$  è un anello non commutativo rispetto alle usuali operazioni di addizione e moltiplicazione di matrici. Verificare inoltre che  $\mathcal{M}_n(A)$  è unitario se e soltanto se lo è  $A$ .
12. Determinare gli elementi invertibili di  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ .
13. Verificare che

$$F := \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} ; a, b \in \mathbb{Z}_3 \right\}$$

è un campo, rispetto alle usuali operazioni di addizione e moltiplicazione di matrici.

14. Si considerino le seguenti matrici di  $GL_2(\mathbb{C})$

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \mathbf{i} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}; \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}.$$

- Verificare che valgono le relazioni:

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -\mathbf{1} \quad \text{e} \quad \mathbf{ij} = \mathbf{k} = -\mathbf{ji}.$$

Sia

$$\mathcal{H} = \{a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} ; a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$$

Se  $q = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$  poniamo  $\bar{q} = a\mathbf{1} - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}$ .

- Mostrare che  $\mathcal{H}$  è un sottoanello di  $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ . Inoltre, se  $q \neq 0$ , allora

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^{-1}q\bar{q} = \mathbf{1}.$$

Dedurre che  $\mathcal{H}$  è un anello unitario e integro ma NON commutativo in cui ogni elemento non nullo ha un inverso.

$\mathcal{H}$  si chiama l'*algebra dei quaternioni reali*.

15. Siano  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{h} \in GL_2(\mathbb{C})$  le matrici definite nell'esercizio precedente e sia  $\mathbf{1} = I_2$  la matrice unitaria. Mostrare che l'insieme  $\mathbb{H} := \{\pm\mathbf{1}, \pm\mathbf{i}, \pm\mathbf{j}, \pm\mathbf{h}\}$  è un gruppo non commutativo.

$\mathcal{H}$  si chiama il *gruppo delle unità dei quaternioni*.

16. Siano  $X$  un insieme e  $A$  un anello. Mostrare che l'insieme delle funzioni

$$A^X := \{f : X \longrightarrow A\}$$

dotato delle operazioni di addizione e moltiplicazione puntuale:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x); \quad (fg)(x) = f(x)g(x), \quad \text{per ogni } x \in X$$

è un anello. Verificare inoltre che  $A^X$  è commutativo (risp. unitario) se e soltanto se lo è  $A$ .

17. Se  $A$  è un anello, un elemento  $a \in A$  si dice *idempotente* se  $a^2 = a$ . L'anello  $A$  si dice *booleano* se ogni elemento di  $A$  è idempotente.

Sia  $(A; +, \cdot)$  un anello e  $B$  l'insieme degli elementi idempotenti di  $A$ .

- Mostrare che se  $A$  è un dominio, allora  $B = \{0, 1\}$ ;
- Determinare  $B$  quando  $A$  è l'anello delle matrici quadrate  $2 \times 2$  a coefficienti in  $\mathbb{Z}_2$ ;
- Mostrare con un esempio che  $B$  non è necessariamente un sottoanello di  $A$ ;
- Mostrare che  $(B; \oplus, \cdot)$ , dove

$$x \oplus y = x + y - 2xy$$

è un anello booleano.

18. Sia  $X$  un insieme. Mostrare che l'insieme delle funzioni

$$\mathbb{Z}_2^X := \{f : X \longrightarrow \mathbb{Z}_2\}$$

dotato delle operazioni di addizione e moltiplicazione puntuale:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x); \quad (fg)(x) = f(x)g(x), \quad \text{per ogni } x \in X$$

è un anello unitario booleano.

19. Un elemento  $a$  di un anello  $A$  si dice *nilpotente* se  $a^k = 0$  per qualche  $k \geq 1$ .

Mostrare che, se  $n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$  è la fattorizzazione di  $n$  in numeri primi, allora  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$  è nilpotente se e soltanto se  $p_i$  divide  $a$  per  $i = 1, \dots, s$ .

Da questo fatto, dedurre che, se  $p$  è primo, ogni elemento di  $\mathbb{Z}_{p^k}$  è invertibile oppure nilpotente.

20. Sia  $A$  un anello, verificare che l'insieme  $A[X]$  dei polinomi a coefficienti in  $A$  è un anello rispetto alle usuali operazioni di addizione e moltiplicazione di polinomi. Verificare inoltre che l'anello  $A[X]$  è commutativo (risp. unitario) se e soltanto se lo è  $A$ .

21. Sia  $A$  un anello. Mostrare che il polinomio  $u + aX \in A[X]$  è invertibile se e soltanto se  $u$  è invertibile ed  $a$  è nilpotente.

Determinare poi esplicitamente l'inverso del polinomio  $\bar{5} + \bar{6}X \in \mathbb{Z}_{12}[X]$ .

22. Sia  $d \in \mathbb{Z}$ . Mostrare che l'insieme  $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] := \{a + b\sqrt{d}; a, b \in \mathbb{Z}\}$  è un sottoanello di  $\mathbb{C}$ . Determinare poi il gruppo degli elementi invertibili di  $\mathbb{Z}[i]$  e  $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ .

23. Determinare esplicitamente il gruppo degli elementi invertibili dell'anello  $\mathbb{Z}_n$  per  $2 \leq n \leq 15$ .

24. Dimostrare che l'anello  $\mathbb{Z}_n$  delle classi resto modulo  $n$  è un campo se e soltanto se  $n = p$  è un numero primo.