

Università degli Studi Roma Tre
Corso di Laurea in Matematica - a.a. 2010/2011
AL420 - Teoria Algebrica dei Numeri (Prof. S. Gabelli)
Esercizi 6 - Fattorizzazione di ideali

1. Siano I, J ideali frazionari di A . Mostrare che:

$$IJ; \quad I \cap J; \quad I + J; \quad (I :_K J) = \{x \in K; xJ \subseteq I\}$$

sono ideali frazionari.

2. Sia I un ideale frazionario di A . Mostrare che l'applicazione

$$\varphi : (J :_K I) \longrightarrow \text{Hom}_A(I, J); \quad (\varphi(x))(y) = xy$$

è un isomorfismo di A -moduli.

Per questo motivo l'ideale frazionario $(A :_K I) \cong \text{Hom}_A(I, A)$ si chiama anche il *duale* di I .

3. Mostrare che, se I è un ideale frazionario di A , allora $(I :_K I)$ è un sottoanello di K contenente A , isomorfo all'anello degli endomorfismi di A .

Mostrare inoltre con un esempio che $(A :_K I)$ non è necessariamente un anello.

4. Mostrare che un ideale frazionario invertibile è finitamente generato.
5. Determinare:

$$(\mathbb{Z} : 2\mathbb{Z}), \quad (\mathbb{Z}[i] : (1+i)\mathbb{Z}[i]), \quad (\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] : 3\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] + (1+2\sqrt{-5})\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]).$$

6. Siano $A \subseteq B$ due anelli e sia I un ideale (resp. un ideale primo) di B . Mostrare che $I \cap A$ è un ideale (resp. un ideale primo) di A .

Mostrare inoltre con un esempio che $I \cap A$ può essere primo anche se I non lo è.

7. Sia $G := (3 + 4\sqrt{5})\mathbb{Z} + (2 + \sqrt{5})\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$. Determinare l'indice di G in $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

8. Sia $K := \mathbb{Q}(\sqrt{-10})$. In \mathcal{O}_K , fattorizzare l'elemento 14 in elementi irriducibili e l'ideale $14\mathcal{O}_K$ in ideali primi.
9. Sia $K := \mathbb{Q}(\sqrt{-6})$. In \mathcal{O}_K , fattorizzare l'elemento 10 in elementi irriducibili e l'ideale $10\mathcal{O}_K$ in ideali primi.
10. Sia $K := \mathbb{Q}(\sqrt{3})$. In \mathcal{O}_K , fattorizzare l'elemento $5 + \sqrt{3}$ in elementi irriducibili e l'ideale $(5 + \sqrt{3})\mathcal{O}_K$ in ideali primi.
11. Sia $K := \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Fattorizzare l'ideale $p\mathcal{O}_K$ in ideali primi per
 $p = 2, 3, 7, d = 7$; $p = 2, d = 47$; $p = 23, d = 37$; $p = 11, d = -163$.