MA - Secondo scritto (10-7-2015)

1. Un pendolo è costituito da un'asticella di lunghezza ℓ e massa trascurabile e da due masse puntiformi m_1 ed m_2 ai suoi estremi. Il pendolo è libero di oscillare in un piano verticale per effetto della forza peso. In aggiunta, la massa m_1 può muoversi liberamente su una guida orizzontale che si trova nello stesso piano di oscillazione del pendolo.

- Si scriva la Lagrangiana del sistema in termini delle coordinate (x, ϕ) descritte in figura e delle loro derivate.
- Si scrivano le equazioni di Eulero-Lagrange corrispondenti.
- Si riconosca che il sistema ammette una coordinata ciclica, e si identifichi il momento conservato corrispondente (e si chiami A il suo valore). Usando la legge di conservazione di tale momento, si esprima $\dot{x}$ in termini di $A, \phi, \dot{\phi}$.
- Si scriva l'espressione dell'energia meccanica E del sistema. Si sostituisca l'espressione di $\dot{x}$ in termini di $A, \phi, \dot{\phi}$ ricavata al punto precedente in quella dell'energia meccanica, e si esprima quest'ultima in termini di A e delle sole variabili $(\phi, \dot{\phi})$.
- Si disegni il grafico delle curve di livello nel piano $(\phi, \dot{\phi})$ corrispondenti al moto della variabile angolare e se ne discuta la natura qualitativa.
- Si identifichino i dati iniziali per cui il moto *complessivo* del sistema è periodico.
- Si risolva il moto per quadrature.

2. Si consideri la Lagrangiana

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = -\sqrt{1 - \dot{q}^2} + Eq,$$

con $q \in \mathbb{R}$, $|\dot{q}| < 1$ ed $E > 0$.

- (a) Si scriva l'equazione di Eulero-Lagrange del sistema.
- (b) Si determinino l'Hamiltoniana $H(q, p)$ coniugata a $\mathcal{L}$ e le equazioni di Hamilton corrispondenti.
- (c) Si risolvano le equazioni del moto con dati iniziali generici $(q(0), p(0)) = (q_0, p_0)$.
- (d) Si scriva l'equazione di Hamilton-Jacobi che mappi l'Hamiltoniana $H(q, p)$ in $\tilde{H}(Q, P) = P$.
- (e) Si verifichi che, se $P + Eq \geq 1$, la funzione

$$S(q, P) = \frac{1}{E}f(P + Eq),$$

con

$$f(x) = \frac{1}{2} [x\sqrt{x^2 - 1} - \log(x + \sqrt{x^2 - 1})]$$

risolve l'equazione di Hamilton-Jacobi.

- (f) Si scriva la trasformazione canonica associata alla funzione generatrice $S(q, P)$ del punto precedente.
- (g) Si risolvano le equazioni di Hamilton per la nuova Hamiltoniana $\tilde{H}(Q, P) = P$, e si usi la trasformazione di cui al punto precedente per riesprimere la soluzione in termini delle variabili (q, p) . Si riconosca che la soluzione così trovata coincide con quella di cui al punto (c).